

MEDICINA

HOMEOPATICA

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR

Año VII

Noviembre - Diciembre 1944.

N.ºs 11 - 12

REVISTA DE DIVULGACION CIENTIFICA MEDICO-HOMEOPATICA,
DE HIGIENE Y CULTURA MEDICA GENERAL

SUMARIO

	PÁGS.
La Facultad de Homeopatía en Gran Bretaña (Mensaje de S. M. el Rey). — Editorial	161
Bryonia alba en el postoperatorio , por el Dr. Salinas Ramos, de México	164
La constipación , por el Dr. Fortier-Bernoville, de Francia	166
Digitalis , por el Dr. George Mackenzie, de EE. UU.	171
Tratamiento de los trastornos ocasionados por la erupción viciosa de la cordal , por el Dr. W. Kudler	175
Materia Médica Clínica del Dr. Stauffer , Trad. de K. H. (Cont. VI):	
Apis	178
Apocynum cannabinum	178
Aralia racemosa	179
Aranea diadema	179
Argentum	179
Argentum nitricum	180
Un caso de Syphilinum , por el Dr. Lautman	181
El tratamiento de las otitis medias crónicas por la ionización del zinc , por el Dr. Tolosa, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, Argentina	183
La Penicilina (Dificultades en su preparación y su experimentación para considerarla como medicamento homeopático), por el Dr. Amaro Azevedo, del Brasil	188
Noticario	192

Director y Administrador: ALFREDO SEREY VIAL
CASILLA 325 - TELEFONO 44257

SANTIAGO DE CHILE

PRECIO
DE ESTE
EJEMPLAR
\$ 4.—

“MEDICINA HOMEOPATICA”

SUSCRIPCIÓN ANUAL \$ 24.— NÚMERO SUELTO \$ 4.—

Suscripciones y Avisos:

Central de Homeopatía Hahnemann
Santo Domingo 1022 - Casilla 325

Artículos de Redacción, Colaboraciones, Canjes, dirigirse
al Director de esta Revista: ALFREDO SEREY VIAL
CASILLA 325 — SANTIAGO — TELÉF. 44257

SUSCRIBASE
UD. A ESTA
REVISTA

GUIA PROFESIONAL

Dr. CARLOS GOMEZ UGARTE
Médico Homeópata
Agustinas 2314 — Santiago — Teléf. 94820
Consultas de 14.30 a 17.30 horas

Dr. RAUL CELIS
Médico Homeópata
Av. Salvador 62 — Santiago — Tel. 46972

Dr. ANTONIO MORALES DELPIANO
Médico Homeópata
Carmen 307 — Santiago — Tel. 51601 - 87150
Consultas de 14.30 a 17.30 horas

Dr. ERNESTO ANGUIA
Cirujano Dentista
San Antonio 510, Of. 308 — Tel. 30513
Santiago

Dr. RAMON PINEDA
Se trasladó a Ejército 260 para ampliar su
CLINICA HOMEOPATICA (Pensionado)
Nuevo Teléfono 84379 — Santiago

Dr. RAMON CLARES
Psiquiatra
Enfermedades nerviosas y mentales
Regímenes
Sto. Domingo 1443, 5.o Piso — Tel. 85291
Santiago

Dr. CARLOS DAVID S.
Médico Homeópata
Merced 533, 1.o Piso, Depto. 6
Teléfonos: 32151 - 47925
Consultas: 15,30 - 17,30 horas

Dr. S. NECOCHEA
Médico Cirujano
Homeopatía — Iridología
Condell 1434 — Valparaíso

TRATADO DE PEDIATRÍA HOMEOPÁTICA

“El Médico Homeópata de los Niños”

POR ALFREDO SEREY VIAL.

Pídalo en las principales librerías — PRECIO \$ 20.—
En Valparaíso, a FARMACIA KNOP — Plaza Echaurren

MEDICINA HOMEOPATICA

VISITACION
DE IMPRENTAS y BIBLIOTECAS

FEB 8 1945

DEPOSITO LEGAL

“SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR”

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA MÉDICO-HOMEOPÁTICA,
DE HIGIENE Y CULTURA MÉDICA GENERAL

Director: Alfredo Serey Vial — Casilla 325 — Santiago de Chile

Año VII

Noviembre - Diciembre 1944

N.ºs 11 - 12

NOTA EDITORIAL.

LA FACULTAD DE HOMEOPATIA EN GRAN BRETAÑA



BUCKINGHAM PALACE

The President
Faculty of Homoeopathy.

I am glad to send to the members of the Faculty of Homoeopathy my hearty congratulations on the hundredth anniversary of the foundation of the British Homoeopathic Society, and also on its recent formation into a Faculty.

The study of Homoeopathy has made notable progress during the past hundred years, and I am sure that all of you who pursue it will maintain the high standards set by your predecessors in their devoted endeavours to relieve the sufferings of their fellow-men.

George VI

21st January 1944.

Mensaje de S. M. el Rey dirigido a la nueva Facultad

El día 21 de enero de 1944 fué creada en Londres la FACULTAD DE HOMEOPATIA, y la ceremonia inaugural fué honrada con un mensaje de S. M. el Rey de Inglaterra. Su primera reunión se efectuó en el "LONDON HOMŒOPATHIC HOSPITAL, Great Ormond Street, bajo la presidencia de Sir John Weir, G. C. V. O., M. B., médico de S. M. el Rey, de S. A. R. la Reina María, y médico Consultor del Hospital Homeopático de Londres, una de las figuras más representativas y prestigiosas del mundo médico del Imperio Británico.

Este acontecimiento de tanta trascendencia para la Medicina General, y, muy especialmente, para honra y progreso de la Homeopatía inglesa, fué dado a conocer a los diferentes sectores de la profesión y a la opinión pública de Gran Bretaña, por "British Medical Journal", por "The Lancet", por "The Times" y por toda la prensa. La revista "The British Homœopathic Journal", en su edición de mayo de 1944, que recientemente hemos recibido y con la cual mantenemos un cordial canje desde hace varios años, nos permite reproducir auténticamente el mensaje de Su Majestad el Rey de Inglaterra y que publicamos en nuestra portada de honor. La traducción en idioma español corresponde a lo siguiente:

"Me complace en enviar a los miembros de la Facultad de Homeopatía mis felicitaciones cordiales en el centenario de la fundación de la British Homœopathic Society, y además por su reciente transformación en Facultad.

"El estudio de la Homeopatía ha hecho notables progresos durante los pasados cien años, y estoy seguro que todos vosotros continuaréis y mantendréis en alto el estandarte plantado por vuestros predecesores en sus fervientes esfuerzos por aliviar los sufrimientos de sus conciudadanos."

JORGE R. I.

Palacio Buckingham, enero 21 de 1944.

Es así como mediante la creación de la Facultad, que es una entidad legal, la profesión médica homeopática adquiere todos los derechos de que han gozado los otros médicos en el ejercicio oficial de la Medicina General, teniendo entre otros derechos, el de supervisar y coordinar la enseñanza de la Homeopatía a la profesión, y el de expedir diplomas a aquellos médicos

En nombre de Hahnemann y por la
humanidad doliente, ¡¡homeópatas
del mundo, uníos!!

que hayan cursado con éxito los cursos y exámenes correspondientes, usando las iniciales siguientes: Fellows, F. F. Hom.; y Miembros, M. F. Hom.

Se rindió homenaje al Dr. Frederick Quin, fundador y primer Presidente de la Sociedad Médica Homeopática Británica, que lo fué desde el año 1844 hasta 1878, año de su fallecimiento, colocándose —como un acto de gratitud y de recuerdo imperecedero— un retrato de este esforzado luchador por la causa hahnemanniana en Inglaterra.

El Consejo de la Facultad de Homeopatía está formado por notables médicos, y es como sigue: Presidente, Sir John Weir, G. C. V. O.; Ex Presidente de la B. H. S., Dr. John Paterson; Vicepresidentes, Dr. C. E. Wheeler, Dr. D. M. Borland; Tesorero Hon., Dr. P. Hall-Smith; Fellows, Dr. F. H. Bodman, Dr. W. E. Boyd, Dr. W. L. Templeton; Miembros, Dr. H. F. Banks, Dr. A. T. Cunningham, Dr. J. Fraser Kerr, Dr. S. Mc Ausland, Dr. G. R. Mitchell, Dr. P. G. Quinton; Edit. Hon., Dr. Templeton, Dr. Paterson; Secretario Hon., Dr. A. Moncrieff; Bibliotec., Dr. Quinton; Comité de Investigaciones: Sir John Weir, G. C. V. O. (Presidente), Dr. J. Paterson, Dr. Mitchell, Dr. Bodman, Dr. Quinton, Dr. Sundell, Dr. Templeton, Dr. Briggs, Dr. Boyd; Comité de Educación: Dr. Borland, Sir John Weir, G. C. V. O., Dr. Henderson Patrick, Dr. Rorke, Dr. Mac Gowan, Dr. Kenyon, Dr. Templeton, Dr. Moncrieff.

“MEDICINA HOMEOPATICA”, en el nombre de todos los médicos homeópatas y de los “Amigos de la Homeopatía” de Chile, se asocia al júbilo de sus colegas británicos y al de todos los homeópatas del mundo, por la creación de la Facultad de Homeopatía en Londres, y hace votos por el progreso incesante de esta Ciencia Médica en un imperio, en una nación que siempre ha sabido darle la importancia y la trascendencia que la Homeopatía tiene para la conservación de la salud de su pueblo, favorecida y entusiastamente aceptada por toda la familia real, dando así un ejemplo magnífico a todos los gobernantes y legisladores de todos los países del orbe.

EL DIRECTOR.

Felices Pascuas y un Próspero Año Nuevo deseamos a todos nuestros lectores, colaboradores y amigos de la Homeopatía.

La Dirección.

BRYONIA ALBA EN EL POSTOPERATORIO

Por el Dr. Luis R. Salinas Ramos, Catedrático de la Escuela Nac. de Medicina Homeopática y Director del Hospital Nacional Homeopático

El Cirujano moderno conociendo el traumatismo que en toda intervención quirúrgica se provoca, trata, en todo momento, de procurar que los tejidos sean mortificados lo menos posible; pero a pesar de ello, el traumatismo se efectúa y en ocasiones se presentan trastornos que suelen ser de gravedad si no son atendidos debidamente.

Sin embargo, el médico, principalmente en la actualidad, debe encauzar sus trabajos a prevenir a fin de no verse, posteriormente, en la necesidad de remediar.

El Cirujano de nuestra Escuela, aparte de sus conocimientos en Cirugía, cuenta con la valiosa cooperación de varios medicamentos homeopáticos que tienen una indicación precisa en el pre y en el postoperatorio, previniendo, modificando o eliminando los trastornos inherentes a una intervención quirúrgica.

Es ampliamente conocido del médico homeópata el papel terapéutico que tiene el *Arnica montana* en traumatismos de cualquier naturaleza. Hahnemann nos dice respecto a tal medicamento: "todos los síntomas que acompañan a las contusiones violentas y a los desgarros de fibras son análogicamente producidas por *Arnica* en el organismo sano" y el Dr. Ricardo Hughes sostiene que "casi infaliblemente se evitarán las malas consecuencias, si se la administra antes de que haya tenido lugar el daño orgánico". Esta afirmación de Hughes la he comprobado plenamente en el Hospital Nacional Homeopático, en la Sala de Cirugía General de Mujeres, a mi cargo, en aquellos casos en que debido a la clase de intervención por efectuar se hace necesaria la administración de tan importante remedio.

A pesar de que *Arnica* tiene una indicación más precisa en los traumatismos y heridas de los músculos, sabemos el importante papel que desempeña en las hemorragias y en la reabsorción de la sangre extravasada en los tejidos por causa mecánica, en las lesiones de las partes blandas que acompañan a las fracturas, en la inflamación del tejido celular con hiperestesia a la presión, por insignificante que ésta sea, y su acción para evitar el peligro de reacción en la conmoción cerebral y su contribución en la rápida cicatrización. Además, el Dr. Grauvogl, confirma mediante experimentaciones, la propiedad que le atribuyen algunos autores de impedir la supuración.

Hughes señala que "en su papel antidotario de las violencias mecánicas, el *Arnica* es casi única, hallando sólo algún ligero punto de contacto en *Rhus tox.* e *Hypericum perf.*, y finalmente está de acuerdo con el Dr. Bayes, de que en los efectos de las heridas y contusiones antiguas debemos aplicar potencias infinitesimales.

He querido tratar, aun cuando someramente, de este medicamento, por la alternancia que hacemos de él, en el Hospital Nacional Homeopático, con *Bryonia alba*,

Contribuya Ud. a la difusión de la Homeopatía, haciéndose miembro de la ASOCIACION HOMEOPÁTICA DE CHILE.

**Cuota incorporación \$ 20,—
Trimestral. \$ 30,—**

Santiago — Casilla 970

medicamento policresto de gran valor en el postoperatorio de algunos casos.

La *Bryonia alba*, cuya patogenesia cuenta, de acuerdo con la Enciclopedia de Allen, con cerca de dos mil síntomas, fué experimentada primeramente por Hahnemann y seis discípulos, posteriormente reexperimentada por la Sociedad Austríaca de Experimentación. Ha sido si no el primero si uno de los primeros medicamentos experimentados en animales, como puede comprobarse en el Vol. XXV del *British Journal of Homœopathy*.

Su acción fisiológica se caracteriza por producir inflamación, con acción específica sobre las serosas, dando lugar a exudación y siendo, entre nuestros medicamentos, el que afecta más a estas membranas. Hughes, cita los resultados encontrados en las necropsias de animales envenenados con ella, mencionando que en las experimentaciones efectuadas en Viena se encontraron, en dichos animales, la pleura, peritoneo y aracnoides congestionados y llenos de serosidad.

Sabemos igualmente, que la pleura es la serosa más frecuentemente afectada por la *Bryonia* y de ahí que Hughes manifieste que los pulmones, por su contigüidad pleural, sean de los primeros órganos afectados, presentando gran número de síntomas que acusan claramente la intervención que tienen las serosas que los cubren. En igualdad de condiciones pueden apreciarse, en la patogenesia, trastornos cerebrales, hepáticos, renales y articulares en que intervienen las serosas de revestimiento. Tales datos han sido ampliamente comprobados por medio de las necropsias efectuadas en animales intoxicados por ella, lo que ha venido a dar la explicación a un gran número de síntomas presentes en la **experimentación pura en el hombre sano.**

No me extendiendo a hablar de la acción de *Bryonia* sobre las mucosas, fibra muscular, aparatos y sistemas por ella afectados por ser secundario al tema que trato, anotaré

únicamente que algunos trastornos como la constipación postoperatoria podrían precisar su indicación.

El Dr. Truks nos dice respecto a *Bryonia* "de un número regular de casos que he observado cuidadosamente, resulta el hecho de que *Bryonia* es el remedio soberano en todas las inflamaciones de las membranas serosas que han llegado hasta el estadio de derrame. Esta acción se extiende sobre las serosas parietales de las cavidades torácica y abdominal y de las que revisten a los órganos situados en ellas y que muchas veces son atacadas por la inflamación".

Conocida la acción de *Bryonia* sobre las serosas y su indicación como el medicamento más preciso para la congestión de ellas, el Dr. Eugenio Maceiras Bugallo, Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Homeopático, ha venido empleándola con criterio profiláctico en el postoperatorio de intervenciones en que forzosamente se traumatizan las serosas, dicho medicamento ha sido alternado con *Arnica montana*, por la acción de este último sobre los tejidos mortificados durante el acto operatorio.

Desde que me hice cargo de la Sala de Cirugía General de Mujeres, seguí idéntico procedimiento con resultados análogos. He observado con atención los casos operados en ambos Servicios cuando por la naturaleza de la intervención ha sido sumamente mortificada la serosa peritoneal y tengo la seguridad de que no siendo por la suministración de este medicamento, se hubieran presentado trastornos de congestión y aun de exudación serosa postoperatoria, lo que no ha sucedido. Pudiendo afirmar, igualmente, que a la utilización de dichos medicamentos, con criterio profiláctico, se debe que las peritonitis postoperatorias estén desterradas del Hospital Nacional Homeopático. En nuestra clientela particular hemos observado igual fenómeno, por lo que llegamos a una conclusión respecto

LA CONSTIPACION

Por el Dr. M. Fortier-Bernoville, de Francia

La lentitud del tránsito intestinal puede provocar la rareza de las evacuaciones. Las causas son múltiples: hay casos de constipación accidental; hay la más importante una constipación crónica que puede ser, unas veces funcional y otras veces por lesiones intestinales o peritoneales.

CONSTIPACIÓN FUNCIONAL. — Atonía por debilidad congénita, envejecimiento, caquexia, otra causa es la desesperación del reflejo anal, insuficiencia de los músculos abdominales y de las contracciones del diafragma (vida sedentaria, civilización); trastornos glandulares y vagosimpáticos (hipotiroidismo, hipófisis posterior).

Constipación con lesión: perivisceritis y

a *Bryonia alba*, idéntica a la que llega Hughes, es decir: que *Bryonia alba*, casi infaliblemente, evitará trastornos inflamatorios en las serosas, si se aplica antes o inmediatamente después de una intervención quirúrgica, de cualquier región en que se mortifique esta membrana.

Para finalizar, he de hacer mención de las potencias usualmente empleadas por nosotros, éstas han sido: **desde la primera a la tercera decimales.**

Esperando que las observaciones llevadas a cabo y los resultados satisfactorios obtenidos sean de utilidad a los médicos que además de nuestra terapéutica manejan el bisturí, cuando éste es indispensable, hemos querido presentar estos breves datos para confirmar la acción de nuestros medicamentos en su segundo y brillante modo de obrar o sea en su aspecto profiláctico que tan útil resulta como colaborador del Cirujano.

De "Medicina Homeopática Mexicana", 1944.

adherencias peritoneales (algunas veces por tuberculosis peritoneal), lesiones de las vísceras abdominales (vesícula, ovario, trompas, riñón, apéndice); lesiones rectales (hemorroidales) y en fin colitis, sea con espasmo de reacción o bien con atonía o también con arritmia intestinal.

Lo que impresiona el espíritu, es la multitud de personas NO enfermas que son constipadas. Y no obstante la frecuencia actual de la constipación es debida a la civilización; porque era rara antes del siglo XVII y no existía en los pueblos primitivos o en los animales no domesticados.

La constipación con malestar, no será para algunos autores debida directamente a la reabsorción, sino al hepatismo produciendo fenómenos de alergia digestiva, de ahí náuseas, cefalea, lengua blanca, vértigos, etc. Eso nos parecería bien siempre que se describiera con el nombre de hepatismo, un estado caracterizado por un lado por estasis intestinal y en segundo lugar, por disfuncionamiento hepático; en efecto el término de insuficiencia hepática no debe ser reservado según Chiray, sino a los casos graves y, probados por el laboratorio, las lesiones de las células hepáticas que produce la detención parcial o completa de su funcionamiento.

En los casos de constipación dolorosa, es la colitis la responsable.

La terapéutica clásica y aun los procedimientos de la Medicina habitual, son limitados en su acción sobre la constipación. **Purgantes y laxantes no tienen más que una acción efímera y hay que repetirlos siempre. Son paliativos y aun más dañinos algunas veces cuando se abusa de ellos que la constipación misma.** No como los productos inertes: el agar-agar, la parafina que no son dañosos; fuera de esto,

el régimen, la gimnástica y el masaje abdominal; la hidroterapia abdominal fría; las curas termales (Chatel-Glyon sobre todo y después Plombieres); los supositorios son reaccionales y sin daño. La enteroclisís debe reservarse a casos muy especiales.

El naturismo afortunadamente viene en nuestra ayuda gracias a algunos procedimientos muy simples que deberían volverse clásicos. El vegetarianismo completo no puede tener éxito más que en enfermedades especiales. Pero es indudable que el crudovismo de un lado y por otra parte una alimentación con predominio de legumbres frescas, permite no solamente hacer desaparecer muchos casos de constipación, sino llegar a obtener hasta cierto punto una reeducación intestinal.

Entre las diversas técnicas naturistas recomendadas por Carton en Francia, Bircher en Suiza, Puig Ibarra en Madrid, pondría en primer lugar, a mi modo de ver, los cuatro sistemas siguientes:

1.º El procedimiento de los frutos, no acompañando pero precediendo las tres comidas. Se termina la comida por queso o un ligero entremés. Este sistema es muy bueno. Algunas veces, es suficiente una pequeña cantidad de frutas, por ejemplo, un racimo pequeño de uvas, mientras que una cantidad tomada después de la comida no tiene acción.

2.º La supresión sempiterna de café o leche de mañana en los hepáticos, y su reemplazo ya sea por una comida a la fourchette análoga a las otras, o bien por alimentos de dietética especiales o por dos o tres frutos crudos de la estación. No hay nada más indigesto e irracional, en los casos de hígado tórpido que la leche o el café; es suficiente las más de las veces su supresión para aliviar los trastornos digestivos.

3.º El sistema de la ciruela-pasa cruda (Carton), cinco o seis ciruelas hendidas por mitad, remojadas en agua fría durante tres

días, o hervidas durante 36 horas cambiándose el agua cada tres horas. Este sistema reeduca absolutamente el intestino. Se disminuye el número de ciruelas desde que el alivio sobreviene.

4.º En los ptósicos atónicos, el cinturón de Sigaud, puede alguna vez por sí solo disminuir la constipación.

La Homeopatía por sí sola es capaz, después de un tratamiento bien conducido varias semanas, de disminuir o suprimir la constipación. *El intestino se reeduca; el temperamento cambia.*

Naturalmente, este método puede ser empleado solo o bien asociado al naturismo. En la fase transición se puede permitir el empleo de lubricantes intestinales como el agar-agar, aceite de parafina, etc. Además, la higiene debe modificarse porque si no la curación no será duradera. La Homeopatía unida a la higiene general de la vida, transforma el temperamento y combate los daños de la vida confortable que nos brinda la civilización contemporánea.

II. — FORMULARIO

1.º Mi prescripción favorita:

a) *Tebaicum* u *Opium* M, *Plumbum met.* M (3 dosis de cada uno. Alternar esas seis dosis una cada siete días por la tarde, al acostarse, en un poco de agua).

b) Durante las seis semanas del tratamiento: *Bryonia* 30, *Taraxacum* (2 gr. por la mañana al despertar, 2 gr. diariamente a las 16 horas), *Graphites* 30 (2 gr. todas las tardes al acostarse, en un poco de agua, o una hora después de la cena).

c) *Calcarea acetica* 1x trit. (0,20 en un poco de agua al principio de las comidas del medio día). *Taraxacum* 3x (10 gotas en un poco de agua, todos los días antes del desayuno, o en la comida de la tarde). *Sanicula*, *Hydrastis*.

Esta prescripción responde ocho veces sobre diez en los casos simples. El valor de

Plumbum y *Opium* dado cada siete días, me ha sido señalado por el Dr. L. Renard. El Dr. Dassouville Jr., ha llamado la atención hacia *Calc. acet.* cuya patogenesia es de Hahnemann. Cada uno de los medicamentos indicados aquí no obraría solo. Es su asociación sinérgica la que da los éxitos (*).

2.º Constipación y obesidad (hipotiroideo, insuficiencia genital; algunas veces también trastornos hipofisarios y pancreáticos).

a) *Graphites* M, *Sulphur* M, *Graphites* M (tomar esas dosis en el orden indicado con diez días de intervalo, por la tarde en un poco de agua o una hora después de la comida de la tarde).

b) *Antimonium crudum* 30 (2 gr. diarios al despertar), *Taraxacum* 30 (2 gr. diarios a las 4 de la tarde), *Graphites* 30 (2 gr. al acostarse).

c) Igual que para la prescripción primera.

3.º Constipación con el fenómeno de la deposición de resorte. La deposición parcialmente expulsada después de grandes esfuerzos, parece volver al ano cuando cesa el esfuerzo.

a) *Thuja* 200, *Silicea* M, *Thuja* 200 (tomar esa dosis en el orden indicado, cada una con diez días de intervalo, por la tarde en un poco de agua o una hora antes de la comida de la tarde).

b) Tomar todos los días: *Silicea* 30 (2 gr. al despertar), *Sanicula* 30 (2 gr. por la tarde, salvo el día de las dosis).

c) *Sanicula* 3x (10 gotas en un vaso de agua al principio del almuerzo).

4.º Constipación de los ancianos (o de sujetos debilitados que no pueden deponer más que parados; signo de *Causticum*; la

evacuación pasa mejor si el enfermo está de pie).

a) *Causticum* 200, *Opium* M, *Causticum* M, *Opium* M (tomar esas dosis en el orden indicado con 10 días de intervalo, por la tarde en un poco de agua o una hora después del almuerzo).

b) Durante seis semanas tomar todos los días:

Antimonium crudum 30 (2 gr. al despertar), *Aloe* 30 (2 gr. de cada uno juntos), *Taraxacum* 30, *Plumbum* 30 (tomados a las 4 de la tarde, salvo el día de las dosis).

c) *Taraxacum* 3x, *Hydrastis* 3x (5 gotas dentro de un poco de agua al principio de las dos principales comidas).

He aquí los signos de los principales remedios:

1.º — El sujeto tiene deseos frecuentes pero ineficaces de deponer: *Anacardium*, *Lycopodium* y *Nux vomica*.

Anacardium.— Cuando se indica, el deseo de deponer desaparece por el esfuerzo; el sujeto tiene la sensación de tener un tapón en el recto que no puede expulsar. Hay trastornos en el estómago que se alivian comiendo.

Lycopodium.— Está indicado sobre todo en los infantes o en los ancianos, pero también en los adultos cuando existen deseos frecuentes e ineficaces con constricción espasmódica que impide el deponer y causa gran dolor. Los trastornos intestinales están asociados a una deficiencia hepática. Hay flatulencia y dolores en el lado derecho del vientre y en la región del hígado.

Nux vomica.— Tiene deseos frecuentes e ineficaces, paso de pequeña cantidad de materias y sensación que nunca pasa. Conviene sobre todo en los casos en que se ha abusado de laxantes y purgantes sin resultado (30x). El sujeto tiene el vientre lleno de gases después de las comidas y experimenta el deseo de estar libre de vestidos y experimentando a la vez un gran deseo de

(*) Algunos médicos homeópatas franceses son adictos a las fórmulas compuestas. Respetamos su criterio, pero no lo aceptamos por estar en oposición con las enseñanzas de Hahnemann. — Nota de la Dirección de "Homeopatía", México.

hacer la siesta. Por lo general, hay hemorroides.

2.º — El sujeto no tiene deseos de evacuar: *Bryonia*, *Opium* y *Graphites*.

Bryonia. — Constipación de materias voluminosas, secas, muy duras, teniendo el aspecto de quemadas, agravación por estar en la playa, por el reposo y la inmovilidad. Las deyecciones son raras y no sobrevienen más que cada tres o cuatro días.

Graphites. — Deyecciones secas y duras, en pequeños fragmentos reunidos por mucus. Expulsión algunas veces de mucus después de la deyección. Dolores frecuentes en el ano, debidos a la irritación provocada por una fisura anal o por eczema perianal.

Conviene generalmente a personas gruesas con tendencia a la somnolencia.

Opium. — Conviene particularmente a la constipación de los ancianos. Las evacuaciones son pequeñas y muy secas; no hay deseos de deponer; el sujeto se ve obligado a usar lavado intestinal para poder deponer.

3.º El sujeto deponer con gran dificultad para expulsar las materias que no pueden salir: *Alumina*, *Causticum*, *Silicea*, *Sulphur* y *Plumbum met.*

Alumina. — Al contrario de *Graphites*, conviene a las personas secas y delgadas, no desean deponer y no pueden tener deseos antes de que tengan gran acumulación de materias. Las deyecciones son duras y cubiertas de moco, arcillosas, adherentes como de mastic.

El enfermo se ve obligado a hacer grandes fuerzas, aun cuando las deposiciones sean suaves.

Causticum. — Tiene deseos frecuentes pero sus deposiciones son acintadas, de pequeño calibre; se evacuan con gran dificultad, con dolores y esfuerzos. La evacuación se hace mejor de pie.

Silicea. — Conviene sobre todo a los infantes aun cuando también a los adultos cuando la deposición sale en parte del ano

y vuelve a entrar parcialmente a causa de la contracción brusca del esfínter. La atonía intestinal se observa en los niños durante la dentición, en las jovencitas en el momento de las reglas.

Sulphur. — Tiene deseos, pero las deposiciones son anchas y muy duras como desecadas, provocando tal dolor que el enfermo se ve obligado a desistir en el primer esfuerzo. Sensación de calor en el recto, ardor y latidos en el ano, la constipación alterna algunas veces con diarrea. El sujeto es algunas veces un adulto congestionado, propenso a comezones y eczemas. Piel malsana.

Plumbum met. — Deyecciones muy secas, constipación dolorosa precedida de cólicos. Retracción de vientre. Evacuación de fragmentos duros y secos como deyecciones de chivo. Alivio por el masaje y el tratamiento.

4.º — Evacuaciones secas, tan secas que se desmenuzan al ser emitidas: *Natrum mur.* y *Magnesia mur.*

Natrum mur. — Evacuaciones secas y desmenuzadas; el ano está doloroso y ardiente; mucus adherentes sobre la evacuación que sobreviene cada segundo o tercer día. Depresión, adelgazamiento; el sujeto adelgaza aún cuando coma bien. Sudores comiendo, debilidad. Triste e irritable, se agrava cuando se le consuela. Sed de grandes cantidades de agua fría algunas veces repetidas.

Magnesia mur. — Deyecciones secas en pequeños fragmentos que se desmenuzan. Hígado seco y doloroso. Vesícula biliar sensible con dolores, calambres aliviados comiendo. Lengua amarilla, agravación acostado y por tomar leche. En las mujeres muchas veces se presenta junto con la constipación, las flores blancas características del remedio.

5.º — *Silicea* se relaciona a *Sanicula* y *Thuja*, remedios también de la deyección de resorte.

Sanicula.— Evacuación constituida por una masa única, pesada, compacta y muy voluminosa. Dolores lumbares, deseos de jamón o de leche fría.

Thuja. — Algunas veces, el sujeto de *Thuja* tiene evacuaciones suaves, sobre todo después del desayuno.

La constipación de deposiciones que salen parcialmente, puede alternar con deposiciones suaves con gases. *Trastornos después de la vacuna o gonorrea; sicosis, verrugas.*

6.º — En los casos difíciles, pensaremos en estos cuatro remedios: *Hydrastis, Antimonium crudum, Aloes* y *Taraxacum*.

Hydrastis.— Gusto amargo, *lengua amarilla* guardando los bordes la impresión de los dientes; aftas, debilidad. Tendencia al cáncer, deposiciones difíciles y mezcladas de mucus. Constipación agravada durante el embarazo, después de purgantes.

Antimonium crudum. — Deposiciones parte sólidas y en parte líquidas, *alternancia de constipación y diarreas. Constipación de los ancianos, lengua blanca.*

Aloe. — Borborigmos. Expulsión de evacuaciones diarreicas (con incontinencia del esfínter y sobre todo en el momento del paso de gases). Alternancia con la constipación, abuso de laxantes, abuso de cerveza por largo tiempo (algunas veces, es el remedio de la rectitis y de la constipación).

Taraxacum. — *Buen remedio del drenaje de los constipados, con disfunción del hígado* (hay algunas veces diarrea en su patogenesis).

De "Homeopatía", México, 1942.

Tradujo, L. Roxy.

En el nombre de HAHNEMANN
y por la salud de la humanidad do-
liente, ¡homeópatas del mundo,
uníos!

BOTICA = DEL = INDIO

DOGGENWEILER Hnos. Ltda.

Ahumada 2 = Casilla 959

SANTIAGO

Sección Homeopatía

La seriedad de esta farmacia,
la escrupulosidad profesional
de sus dueños y el origen
legítimo de sus medicamen-
tos homeopáticos, dan a su
clientela todas las garantías
para un servicio esmerado y
concienzudo

Surtido completo de
yerbas medicinales

DIGITALIS

Por el Dr. George W. Mackenzie

Hice una de mis mejores experiencias con *Digitalis* hace 3 años. Después de dormir profundamente durante siete horas, desperté siendo las cinco de la mañana. Como no necesitaba levantarme permanecí en la cama acostado tranquilamente sobre el lado derecho, durante algunos minutos, cuando noté que faltaban algunos latidos en la marcha de mi corazón. Este latía bastante regularmente, pero, cada 3 o 4 movimientos, faltaba uno. Me levanté para buscar mi reloj, contar el pulso y controlar los latidos que se omitían. Este no tenía otras irregularidades que las ya apuntadas. El promedio me dió 55 latidos por minuto. Estos síntomas me sugirieron *Digitalis*. No tomé en cuenta ningún otro. El asunto era bastante interesante para hacer el siguiente experimento. Tomé una dosis de *Digitalis* 20 mil y esperé media hora para observar su efecto. Desgraciadamente me dormí despertando una hora después, pero observé entonces que el pulso se había corregido y las interrupciones no han vuelto a aparecer desde entonces. Repetí la misma dosis varias semanas después y una tercera vez tres meses después de ésta.

Digitalis es un medicamento que he estudiado atentamente durante los últimos años, tal vez con más atención que cualquier otra droga. La he prescripto en mi práctica repetidamente en los últimos cincuenta años, habiendo notado en ella ciertas particularidades, o características prominentes, cada una de las cuales me enseñó una lección que vale la pena mencionar.

La primera de ellas ocurrió hace 45 años en el tratamiento de una claudicación del corazón. Estaba de moda entonces prescribir una combinación de hojas de *digitalis*, mercurio y albarrama, un gramo de cada una, que se hacían tomar tres veces

al día, hasta que el enfermo orinaba por galones y poco a poco liquidaba su anasarca. Este tratamiento se hizo a pesar de haber yo visto, siendo interno de Jos. Guernsey, que éste obtenía mucho mejores resultados prescribiendo *Apocynum* 200X en una sola dosis. En el tratamiento de la hidropesía los resultados obtenidos por Guernsey aventajaron a todos.

La segunda nota sobre *Digitalis* como remedio del corazón, la obtuve cuando dos reputados profesores cardiólogos, en mi propio colegio, prescribieron dosis fuertes y repetidas de Digital, o uno de sus alcaloides (Glucósido), para hacer marchar más lentamente el corazón, en casos de fibrilación, con éxito, pero por tiempo limitado. Todos los casos así tratados, que tuve oportunidad de seguir, sufrieron recaídas y sucumbieron mucho antes que otros enfermos tratados con medicamentos menos heroicos.

La tercera observación muy importante fué una experiencia muy útil con Digital. Ocurrió hace cinco años, cuando tuve el honor y el placer de tratar a uno de los más eminentes médicos homeópatas de Filidelfia, un agradable anciano de 90 años. Se encaminaba hacia los estados finales de la senilidad. Le hacía dos visitas semanales. Observé entre otros síntomas que de cada tres o cuatro latidos del corazón, uno faltaba. Mi enfermera Srta. OD., una excelente observadora, vino una mañana y me dijo que el Dr. K. estaba tomando secretamente Digital. Le pregunté, "¿Cómo lo sabe?", y me contestó, "Busqué sus síntomas en la Materia Médica y los encontré prácticamente a todos, encuadrados dentro de *Digitalis*".

Las intermitencias en el corazón, ocurren frecuentemente en enfermedades na-

turales, pero es mucho más frecuente aún en casos de enfermedades naturales que han sido tratadas con Digital a dosis fisiológicas en forma exagerada. No me costó nada entonces convencerme de que la enfermera tenía razón en sus aseveraciones respecto al uso de la Digital por mi enfermo. En la visita siguiente le pregunté: "¿Por qué toma usted Digital?" El Dr. se sorprendió y me dijo, "¿Cómo lo sabe?" Le contesté que era mi enfermera la que la había descubierto y no yo. La llamé y lo confirmé, diciendo que había estado toda la noche estudiando escrupulosamente la Materia Médica, y así había descubierto el secreto. Dijo entonces que tomaba Digital porque "lo hacía sentirse mejor". Le rogué interrumpiera su uso y le prescribí una dosis de desensibilización de *Digitalis* 500x. En la visita siguiente a los tres días, no pudo encontrarse la falta de latidos, ni volvió a tener recidiva alguna en los tres últimos años de su vida. Como en otra ocasión ya he hecho referencia a este caso no puedo entrar en más detalles ahora, pero él me impulsó a buscar otros semejantes. No fué difícil encontrarlos. De tal observación, en poco tiempo aprendí que hay dos tipos diferentes de enfermos en los cuales la Digital actúa en forma beneficiosa. A un grupo de éstos pertenecía el anciano médico que había tomado Digital en dosis fisiológicas y "que lo hacían sentirse mejor". Así pude yo perfeccionar mi observación sobre Digital, en la cual se prueba que usando el remedio en forma infinitesimal, en una dosis única, el beneficio es permanente.

El otro grupo en el que hallamos indicado el uso de la Digital, está constituido por enfermos en los que estando indicada la droga, no mejoran a causa de la dosis grandes empleada. Es en el curso de una enfermedad natural en la que los síntomas reclaman la droga, y en este grupo ella responde bien en dosis infinitesimales, como remedio homeopático.

He citado brevemente un caso típico de este grupo.

El paciente esta vez fué el que esto escribe, que sabe perfectamente bien que nunca tomó una dosis de Digital y que curó con una potencia 20 mil. Antes y después he encontrado muchos otros casos típicos, y los he tratado exitosamente con las más altas potencias, aunque debo hacer constar que son muchos más los que he encontrado del primer grupo, es decir, en aquel en que el paciente había estado abusando del remedio.

Otro caso parecido al del anciano médico fué el de una monja de 49 años, sometida a una operación del seno maxilar derecho. Durante el tratamiento posterior se observó que tenía pulso lento, variable entre 50 o 60 latidos por minuto, que aumentaba ocasionalmente por el ejercicio a 85 o más, volviendo a descender a esa cifra subnormal durante el reposo. Además perdía 6 a 8 latidos por minuto. La enferma era un caso de infección estreptocócica crónica con garganta infectada típica (faringitis lateral crónica) que originaba alta tensión arterial (21 máx., 9 mín.). Le prescribí *Digitalis* 20 mil con muy escaso resultado. Las fallas se hicieron una o dos por minuto solamente y después de tres o cuatro semanas se volvió como antes. Un día me oyó decir a mi enfermera que le diera una dosis de Digital, y entonces la paciente observó: "Eso era lo que mi médico me estaba dando", 10 gotas de tintura dos veces al día. Le pedí entonces lo suspendiera y administré la dosis 20 mil. La paciente no tiene más intermitencias. Este es un caso en que *Digitalis* actuó isopáticamente. Puedo añadir que *Streptococcus* 20 mil hizo bajar la presión a 15 máx. y 8 mín.

Podría yo preguntar a aquellos médicos homeópatas que objetan la prescripción isopática, qué habrían hecho en casos de este tipo. Cuando se encuentra un remedio que

está indicado, no importa que sea prescripción homeopática o isopáticamente; lo único que importa es que la dosis sea suficientemente pequeña.

Como lo dije anteriormente, la paciente tenía una infección crónica estreptocócica de la garganta, que daba lugar a síntomas característicos de intoxicación estreptocócica (sensibilización) que incluían: presión arterial alta, albuminuria, vértigo, artritis, etc. La prescripción de *Streptococcus* 20 mil, que mejoró todo, no es sino isopatía pura.

Después de intensos estudios sobre Digitalis, en grandes y repetidas dosis defendidas y usadas por médicos de la vieja escuela y practicada por muchos de los llamados homeópatas, y también después de estudiar **la acción de la misma droga a dosis desensibilizantes** con notables resultados benéficos, he llegado a la conclusión de que: *este remedio es prescripto demasiado frecuentemente en dosis abusivas y muy escasamente en dosis infinitesimales curativas y más beneficiosas.*

En mi opinión, la mayoría de las enfermedades naturales en la que están presentes los síntomas de Digitalis no son pura y simplemente una enfermedad natural, sino pacientes ya tratados con dosis excesivas de Digitalis. Esto me trae a la mente un principio aludido por Hahnemann en la Sección 92 del Organón:

“Pero cuando se trata de una enfermedad aguda, que presenta inminente peligro, y cuando el médico nada puede averiguar con respecto al estado que ha precedido al uso de los remedios, entonces se contenta con observar el conjunto de síntomas tal

como estos últimos lo han modificado, para comprender el estado presente de la enfermedad; es decir, de poder abrazar en un solo cuadro la afección primitiva y la afección medicinal adjunta, que, habiéndose hecho ordinariamente más grave y más peligrosa que la otra, con medios las más de las veces contrarios a los que hubieran debido administrarse; reclama con urgencia auxilios pronto y la aplicación inmediata del remedio homeopático apropiado, para que el enfermo no perezca a consecuencia del tratamiento irracional que ha sufrido”.

* * *

Digitalis produce muchos efectos opuestos, tal vez mucho más frecuentemente que otras drogas. Observemos que produce pulso *lento* y pulso *rápido*. El pulso es más lento que lo normal en el reposo, más rápido que lo normal por el ejercicio. Citando a Jahr: “El pulso que se había vuelto lento resulta acelerado por el más mínimo movimiento del cuerpo”.

Estos efectos opuestos (1) resaltan más

(1) Los efectos opuestos son todos explicables; no trataré de aclarar las contradicciones aparentes. Espero que la exposición de las reacciones pupilares sea suficiente. La contracción de la pupila se debe a espasmos del esfínter músculo pupilar. La dilatación de la pupila no es sino el último estado. Los espasmos de la pupila se deben a irritación. Toda parálisis, no importa que parte de la anatomía complique, es precedida por espasmos, exactamente como las convulsiones preceden a la parálisis.

Regale a sus amigos y a los médicos adversarios gratuitos de la Homeopatía, una suscripción de “MEDICINA HOMEOPATICA”. La ciencia médica de Hahnemann debe ser honrada y correctamente difundida por todos.

marcadamente con Digital, que lo que ocurre con el término medio de las drogas. Unas cuantas ilustraciones son citadas por "Hull's Jahr".

"Sensación de gran *livianidad* del cuerpo".

"Pesadez y pereza de las extremidades".

"Pulso *duro*, débil, rápido".

"Pulso *blando*, débil".

"Pulso *acelerado*".

"Pulso *lento* e irregular".

"*Contracción* considerable de las pupilas".

"*Dilatación* e insensibilidad de las pupilas".

"Gusto dulzón con salivación constante".

"Boca *amarga*".

"Lengua blanca *cubierta*".

"Falta de apetito, con lengua *limpia*".

"Vómito de líquidos *agrios*".

"Vómito de líquidos sin *gusto*".

"*Constipación*".

"*Diarrea violenta*".

"Retención de orina".

"Enuresis".

"Alternancia de secreción disminuída de orina" o "Emisiones copiosas de orín acuoso".

La mayor parte de lo subrayado pertenece a Hull's Jahr. Aunque me responsabilizo de unos cuantos a fin de hacer recalcar el contraste, pero en ningún caso estos informes están equivocados.

Uno de mis propósitos al escribir este artículo es el de recalcar algunos de los síntomas más sobresalientes de Digital. Entre éstos puedo mencionar los siguientes:

Dolor general de todo el cuerpo.

Afecciones nerviosas de todas clases.

Lasitud y gran debilidad.

Peladura de la piel.

Bostezos y deserezos.

Sueño no reparador.

Sensibilidad excesiva al frío.

Fiebre en todo el cuerpo, con calor y rubicundez de la cara.

Pulso débil, rápido, duro — pulso débil, blando.

Pulso lento, 50 latidos o menos por minuto, con intermitencias frecuentes.

Un pulso lento puede llegar a ser tan rápido como 100 por minuto al menor ejercicio.

Vértigo con temblor.

Dolor de cabeza con sensación de presión con dolor en un punto pequeño arriba de los ojos.

Rojez de los ojos, con dolor, especialmente por la tarde.

Irritabilidad disminuída de las pupilas con obscurecimiento de la vista.

Los objetos parecen verdes o amarillos.

Convulsiones del lado izquierdo de la cara.

Lengua blanca cubierta.

Salivación, especialmente después de abuso de mercurio.

Hipo, náusea, vómitos excesivos.

Distensión del abdomen, ascitis.

Constipación, diarrea violenta, diarrea color ceniza.

Retención de orina, dolores cortantes antes y después de la micción.

Ronquera por la mañana temprano.

Titilación de la laringe, provocando tos seca corta, expectoración parecida a almidón cocido.

Envaramiento doloroso y tirantez del cuello y nuca.

Laceramiento paralítico de los huesos del carpo y metacarpo.

Debilidad y lasitud de las extremidades inferiores.

RESUMEN

Digital es una droga excelente, importante por la frecuencia de sus indicaciones y su acción firmemente favorable después de la edad media.

La Digital, tal cual es usada popularmente por la escuela dominante de medici-

TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS OCASIONADOS POR LA ERUPCION VICIOSA DE LA CORDAL

Por el Dr. W. Kudler

Cuando el sitio que debe ocupar la cordal — llamada muela del juicio — es suficientemente amplio para contener a esta pieza dentaria, su erupción acontece sin molestias considerables.

Pero lo más frecuente es que la cordal — la inferior sobre todo — no tenga lugar suficiente, y en este caso se presenta un cortejo de trastornos, algunos de los cuales pueden ser de graves consecuencias.

En tales casos, como consecuencia del proceso de erupción, la fibromucosa que recubre esta pieza, se va levantando paulatinamente; y siendo machacada continuamen-

na y por muchos — sí, demasiados — homeópatas, es una droga perjudicial.

Cuando está indicada, Digital obra pronto y provechosamente, ya sea que se haya usado o abusado o no antes, siempre que sea administrada en “dosis suficientemente pequeña”.

Digital será prescripta *homeopáticamente* cuando la enfermedad natural sea responsable de los síntomas indicados para su administración e *isopáticamente* cuando se haya abusado de ella en el tratamiento de la enfermedad natural.

Digital — siempre que los síntomas del paciente indiquen su uso — no falla nunca.

Cuando el especialista estudia la Materia Médica para hallar el remedio más apropiado para la sintomatología total del paciente, está aplicando firmemente los principios enseñados por Hahnemann.

te cada vez que el paciente mastica, esa fibromucosa se convierte en tejido tumefacto y doloroso que más tarde se ulcera o para mejor decir, se necrosa precisamente en el sitio en que se encuentra comprimida, hasta dejar a la vista un punto blanco que no es otra cosa que la cúspide anterior de la pieza dentaria que estamos estudiando.

Si no se da medicación de ninguna clase las molestias persisten durante cinco o seis días, al cabo de los cuales los dolores aparentemente cesan del todo, porque habiéndose descongestionado la mucosa al entrar en acción las defensas naturales del organismo la oponente al no alcanzarla ya, no la contunde.

Y aparentemente decíamos, porque al cabo de un tiempo más o menos largo sobreviene una nueva crisis con iguales o peores manifestaciones que las antes anotadas y en donde el continuado machacamiento de la fibromucosa por la masticación hace del medio bucal un campo propicio para que la infección progrese cada vez más.

Los primeros síntomas de supuración se manifiestan cuando al paciente se le palpa la región retromolar en donde acusa dolor. Y objetivamente se nota que al presionar se produce un escurrimiento de pus blanco a nivel del borde anterior de la fibromucosa que gradualmente va despegándose de la cara triturante de la pieza dentaria conforme la infección avanza. Dato este último que puede comprobarse introduciendo un estilete de punta roma entre la cara triturante y el capuchón fibromucoso.

En esta fase del proceso es cuando debería administrarse el *Hepar sulphuris*; pero es de advertirse que no siempre puede

Del “Journal of American Institute of Homeopathy”, Filadelfia. Vol. 36, N.º 11, 1943. Trad. de “Homeopatía”, Buenos Aires.

hacerse una delimitación exacta entre la fase congestiva y la de supuración incipiente. Por tal virtud es preferible administrar una o dos tomas al día de *Hepar* a la 30.^a y en los intervalos *Belladonna* a la 3.^a cada dos horas.

Cuando por consecuencia de la infección que avanza, comienzan a hacerse patentes otros síntomas, como son: el trismus por contractura espasmódica de los músculos masticadores; la adenitis, sobre todo de los submaxilares que se infartan en cadena y son dolorosos y móviles; la tumefacción más o menos pronunciada a nivel del ángulo y región inmediata del borde inferior de la mandíbula, es cuando el *Hepar* a la 30 por sí solo da resultados seguros.

Existen casos en que por haber sido invadida la membrana pericemental, la pieza adquiere cierta movilidad, se siente como alargada y el golpe que recibe de la opo-nente al cerrar la boca el enfermo, hace que éste experimente gran dolor. El *Mercurius solubilis* a altas potencias sobre todo a la 30.^a hace que ceda este dolor y todos los demás fenómenos inflamatorios, máxime cuando hay gran salivación y aliento fétido, que en todo caso son signos que nos orientan mejor al elegir el medicamento.

Es así como bajo la acción de los dos medicamentos antes citados: el *Hepar* y el *Mercurius*, se ven ceder también las anginas de repetición que se presentan cada dos o tres semanas y que suceden o con más frecuencia acompañan a las crisis inflamatorias de la fibromucosa que recubre la cordal.

No sería mucho exagerar si se dice que de preferencia esas altas potencias son las

que actúan mejor, ya que yo he tenido dos casos en que habiendo mandado *Mercurius solubilis* a la 6.^a la acción drenadora del *Mercurius* a bajas potencias ha traído trastornos de mayor consideración que los que en esos momentos presentaban mis pacientes.

Cuando sobreviene la complicación ocasionada por la asociación fusoespirilar de Vincent o asimismo la angina del mismo nombre, es cuando y así lo indica el Dr. Fortier Bernoville — el *Mercurius cyanatus* está perfectamente bien, sin olvidar desde luego que análoga acción tienen los medicamentos aplicados en los casos de estomatitis ulcerosas y ulceromembranosas y entre los que pueden citarse *Kali chloricum*, *Mercurius corrosivus*, *Muriatic acid.*, *Nitri acid.* e *Hydrastis*.

No es raro que la infección al persistir por más tiempo se propague invadiendo las regiones vecinas.

Estas lesiones de celulitis sépticas se observan en la región submaxilar, suprahioidea, maxilofaríngea, con amenaza del flegmón séptico de la boca y signos septicémicos verdaderamente alarmantes.

Tengo la experiencia de que en estos casos, una toma de *Pyrogenium* a la 30 es sumamente indispensable para continuar sin riesgo la medicación con *Hepar* a la 30.

Una observación cuidadosa de la mucosa de la boca y asimismo de la región submaxilar y suprahioidea, que a la palpación puede dejar percibir esa gradual tendencia a la leñosidad característica del flegmón séptico, no debe hacerse esperar por más tiempo la aplicación del *Pyrogenium*. Y no es que yo trate de menospreciar por los datos anamnésicos aportados por el paciente

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»

que desde luego son muy importantes. Pero es que ya que estamos sobre esto, quiero transcribir un caso clínico en que el paciente atribuyó en un principio a un gripe, su elevación de temperatura, sus escalofríos y otros síntomas que el día anterior se habían manifestado en él.

Haciendo a un lado de momento lo que el paciente suponía la causa de las manifestaciones observadas antes, y que en cierto modo daban alguna ambigüedad al caso, supuse que se trataba de manifestaciones de una infección que se generalizaba y cuyo punto de origen no era otro que el de la anormal evolución de la cordal izquierda cuyos tejidos vecinos estaban sumamente congestionados y tumefactos. Por lo demás el trismus, la tumefacción y la dureza de la región submaxilar izquierda con tendencia a invadir la región suprahioidea y el cuello me hicieron pensar en lo prudente que sería administrar una dosis de *Pyrogenium* a la 30, lo cual hice al mismo tiempo que mandé *Hepar* a la 30 para tomar algunas horas después. Como esperaba, el cuadro cambió notablemente al otro día, observándose desde luego una manifiesta mejoría.

En otra ocasión sospeché que la fiebre periódica que otro paciente llegado a mi consulta presentaba, no tenía como origen un foco infeccioso localizado en la región de la cordal y segunda gran molar supe-

riores izquierdas. Por lo demás los síntomas locales no asumían las proporciones que me hicieron suponer que la infección local fuera la causa. Sin embargo, el médico que la atendía insistió en que volviera a consultarse. Como los síntomas concordaban con la aplicación de *Mercurius*, le administré para que por lo menos desaparecieran los signos locales, y los generales si aquel foco infeccioso era el causante de la fiebre. Los signos locales desaparecieron; no así los generales, ya que más tarde se hizo el diagnóstico a nuestro paciente quien tenía una lesión pulmonar, verdadera causa de la elevación de temperatura.

Para terminar, sin considerarla nula — más por el contrario es útil — nunca me ha parecido suficiente la medicación local a base de tópicos cáusticos, irrigaciones con antisépticos como la clorazema o enjuagatorios con salicilato de soda, agua yodada, etc., que cuando no se tiene el cuidado de hacerlos con soluciones débiles pueden producir lesiones a la mucosa bucal que de suyo ya se encuentra lesionada.

Yo he suprimido en mi trabajo diario la reprochable conducta de eliminar la segunda gran molar para dar paso a la tercera. Asimismo no considero necesaria la resección del capuchón fibromucoso que recubre la cordal, pues en la medicación antes expuesta se pueden eliminar muy bien estas medidas drásticas que no hacen otra cosa que añadir nuevos sufrimientos.

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, 1942.

Asociación Homeópata de Chile

Organización de Amigos de la Homeopatía que está haciendo una labor efectiva de propagación de las doctrinas médicas hahnemannianas. Solicitudes de admisión, diríjirlas a nombre del Presidente, a casilla 970, Santiago. — Sesiones en calle Estado 33, 2.º piso. — ¡Envíe Ud. su dirección para citar!o!

CALENDOL

Tónico uterino para la higiene íntima de la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann
SANTIAGO — CASILLA 325

(Base: Calendula T. M.)

MATERIA MEDICA CLINICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación VI)

APIS

Las patogenesias muestran acción sobre mucosas, serosas, sangre, glándulas y piel. **Apisinum** es de acción muy parecida.

CLINICA. — *Apis* no está tan indicado para el período agudo de la inflamación con acúmulo fuerte de sangre, sino más bien a continuación cuando se presenta infiltración edematosa de los tejidos, en todo caso antes de la supuración inminente. Los dolores son ardientes y punzantes al principio, existiendo gran intranquilidad; pronto, en cambio, la sensación de tirantez y rigidez de los tejidos o partes, el dolor de magullamiento por cansancio y somnolencia se hacen síntomas característicos. La fiebre es adinámica, alternando poca sed y sudores suaves con sequedad y calor. El corazón tiene tendencia a debilidad, de manera que luego aparecen estancamientos; la sensación típica de escozor y magullamiento debajo de las costillas, parece ser una consecuencia del estancamiento, muchas veces también la tos de cosquilleo, la disnea y la albuminuria (aunque a veces hay nefritis). *Apis* es un medicamento de acción muy segura y me ha dado muy buenos resultados; quisiera mencionar especialmente en las enfermedades crónicas, los quistes ováricos y la oftalmia escrofulosa.

Dosis. — Las diluciones que se recomiendan más son la D 3 a D 6. En los edemas las diluciones bajas accionan mejor, aparentemente se estimula la diuresis por la tonificación del corazón, por ejemplo en la pericarditis y la peritonitis; en la nefritis habrá que considerar también la acción contra la inflamación. En los estados de irritación nerviosa (irritación del cere-

bro con gritos y dolor de cabeza) se justifican las diluciones más altas (D 30). En los quistes ováricos, afecciones de los ojos, podagra, peligro de aborto, afecciones cutáneas siempre han dado buen resultado las diluciones medianas (D 6 a D 12). También se ha usado una tizana de abejas, haciendo hervir 5 a 6 abejas en medio litro de agua.

Apis también se usa al exterior en forma de compresas con la tintura, en caso de podagra y reumatismo articular agudo; dejándose picar por abejas en los alrededores del foco se obtienen resultados parecidos.

APOCYNUM CANNABICUM

La acción se extiende al corazón, riñones, vías digestivas, habiéndose observado también algunos síntomas reumáticos.

CLINICA. — Como tónico cardíaco *Apocynum* a veces tiene acción muy buena en la insuficiencia cardíaca, cuando existe ascitis y anasarca, estando siempre presentes trastornos del tubo digestivo. En la insuficiencia valvular y el enfisema lo he dado con éxito cuando existía el peligro de paralización del corazón. Frecuentemente *Digitalis* en dosis bastantes fuertes tiene que anteceder, siguiéndole bien *Apocynum* durante algún tiempo, si es posible en combinación con el tratamiento de Carell; se ve la eliminación de verdaderos chorros de orina. Como el medicamento no tiene acción acumulativa se puede dar durante un tiempo prolongado, aun en dosis elevadas. Sobre los riñones la acción parece ser primaria, no a causa de la mejor acción del corazón.

Dosis. — He usado la tintura y el ex-

tracto flúido, también la D 1 en afecciones cardíacas; 5 a 10 gotas de la T. M. 3 veces al día son casi siempre suficientes, y se puede aumentar la dosis hasta que se presenten diarreas. Desgraciadamente la acción no es tan segura como en la Digital. En la D 4 a D 6 tiene buena acción en las diarreas de dentición y gran debilidad de los niños, siendo ésta una acción homeopática legítima. En los quistes ováricos, según me parece, he usado con éxito *Apocynum* D 1 después de *Apis*.

ARALIA RACEMOSA

El medicamento acciona sobre las mucosas de las vías respiratorias superiores, afectando especialmente el vago.

CLINICA. — Con éxito rápido, he dado frecuentemente *Aralia* D 3 a D 4 por el síntoma: tos convulsiva o de cosquilleo antes de medianoche, al despertar del primer sueño. Puedo recomendar mucho su uso; ha dado resultado en niños y adultos especialmente tratándose de estados parecidos a fiebre de heno y sin que haya afección notable de las mucosas. Parece que son más bien accesos nerviosos de tos.

ARANEA DIADEMA

CLINICA. — Además de las consecuencias de la malaria, el medicamento ha dado resultados en la constitución hidrogenoidea típica; el síntoma característico es frialdad de las extremidades que no desaparecen ni en la cama caliente, impidiendo el sueño. Generalmente se produce calentamiento de las extremidades y el sueño después de una evacuación abundante de orina. La frialdad en las piernas no existe con regularidad todas las noches, sino periódicamente cuando el tiempo cambia a húmedo o también cuando se ha hecho poco ejercicio al aire libre.

Dosis. — He usado las diluciones bajas (D 2 a D 3), debiendo darse el medicamento por un tiempo prolongado.

ARGENTUM

La plata y todas sus combinaciones afectan en primer lugar el sistema nervioso, produciendo primero irritación y después parálisis tanto en el cerebro como en la médula espinal. En segundo lugar afecta las mucosas, vías digestivas y respiratorias y además las glándulas, especialmente los riñones.

CLINICA. — *Argentum* casi siempre se puede substituir por *Argentum nitricum*, pero no vice versa. El metal parece accio-

* * *

GUÍA PRÁCTICO DEL HOGAR

“EL MEDICO HOMEOPATA DE LOS NIÑOS”

por ALFREDO SEREY VIAL

Tratado de Pediatría Homeopática que compendia las obras de los mejores clínicos homeopatas de la especialidad.

Se vende en las principales librerías del país, en la Central de Homeopatía y en la Botica del Indio; en Valparaiso, Farmacia Knop.

PARA PROVINCIAS SE DESPACHAN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

PRECIO DEL EJEMPLAR: \$ 20,—

Gastos de envío \$ 3,—

Pedidos a Casilla 325
Santiago de Chile

nar con mayor fuerza sobre el tejido cartilaginoso y las facultades mentales, mientras que la sal nítrica afecta más a los riñones, vejiga y mucosas, con tendencia a ulceraciones pertinaces. La plata está indicada en enfermedades profundas y de larga duración que tienen tendencia a ponerse malignas o a transformarse en tisis. Son característicos el marasmo, la caquexia y el estado de ánimo miedoso con depresión, a consecuencia de tara hereditaria en familias degeneradas. Los síntomas nerviosos dominan el cuadro.

Dosis. — El medicamento debe darse siempre por un tiempo largo en diluciones medianas (D 6 a D 12), una dosis cada día, cada dos días o aun más distanciadas. Con dosis demasiado fuertes y uso prolongado fácilmente se puede producir argiria (coloración oscura de la piel por acumulación de plata metálica), como puede observarse en el caso de epilepsia en el cual no conseguí mejoría.

ARGENTUM NITRICUM

CLÍNICA. — Las inflamaciones graves, ulceraciones y procesos destructivos en las mucosas se deberán principalmente a la acción nítrica. Los síntomas nerviosos corresponden a la acción de los dos cuerpos, la depresión más bien a la plata. Mientras que *Acidum nitricum* sólo tiene más bien acción sobre el lado derecho, *Argentum nitricum* prefiere claramente el lado izquierdo. En todos los procesos ulcerativos crónicos de las mucosas, en la úlcera del estómago de evolución lenta, aun en el cáncer del estómago, recto y de la matriz probé *Argentum nitricum* como uno de los remedios más seguros; corresponde en alto

grado a la anemia y discrasia de la sangre. En los catarros intestinales graves, agudos de los niños, he visto curaciones evidentes. En la tabes dorsal alivia los dolores de espalda, desapareciendo a menudo los síntomas vesiculares molestos. También se recomienda para hidronefrosis y puedo confirmar que en un caso desaparecieron rápidamente los síntomas fuertes en las vías digestivas, haciéndose más tarde la operación radical.

Dosis. — En los catarros de las mucosas y ulceraciones están indicadas diluciones medianas (D 4 a D 6). Afecciones del cerebro, médula espinal y nervios exigen diluciones altas (D 30); a veces he alternado con diluciones medianas cuando había afecciones de la vesícula. En la hidronefrosis y nefritis se han obtenido muy buenos resultados con la D 6. El medicamento debe darse durante un tiempo prolongado; von GRAUVOGL, usando la D 2 a D 3 ha logrado influenciar en forma favorable la constitución carbo-nitrógena. Algunos autores recomiendan para la úlcera del estómago la D 2, 15 a 20 gotas antes de las comidas (HILL). Aquí probablemente estamos en campo alopático, donde también se recomienda el nitrato de plata contra la úlcera del estómago. En la indicación homeopática no pensamos en acción cáustica o desinfectante; pues la acción curativa se produciría a través de las vías nerviosas o haciendo volver el tejido a su función normal. Las diluciones medianas se pueden repetir dos a tres veces al día, en las diluciones altas son preferibles dosis distanciadas. Especialmente en afecciones de la médula espinal conviene esperar la acción durante varios días.

(Continuará).

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»

UN CASO DE SYPHILINUM

Por el Dr. S. Lautman

No es a los homeópatas a quienes hay que ponderar los méritos de esta clase de nosodos. Todos saben los efectos beneficiosos y a menudo inesperados que puede obtenerse de **Syphilinum**. Pero las condiciones en que ha sido observado y tratado el caso siguiente, constituye una particularidad que merece referirse. Nunca vimos a la enferma, sabíamos solamente que su madre había muerto algún tiempo después de su nacimiento a consecuencia de una enfermedad cuyos principales síntomas eran ictericia y hemorragias. No se hizo un diagnóstico preciso. Las reacciones de laboratorio fueron negativas. En cuanto al padre lo hemos examinado dos o tres veces en diez años y comprobado una tabes de marcha excesivamente lenta. Con motivo de un viaje a París (la familia vive a mil kilómetros de esta ciudad), el hermano de la enfermita, nacido de un primer matrimonio de su padre, nos refiere que su hermana no se había curado todavía desde hacía dos años que un cirujano le trepanó el calcáneo en el curso de una osteomielitis. La familia estaba desolada porque ningún tratamiento conseguía cerrar la herida del talón de una niña de 13 años, que por otra parte tenía magnífico aspecto. El joven llevó una dosis de **Syphilinum 200** que debía enviar a su tía que hacía veces de madre y que cuidaba a la enferma. He aquí lo que textualmente nos escribió la tía:

“En cuanto a Jacoba, creo que podremos cantar el canto de acción de gracias, pues figúrese que la herida del pie tiene tendencia a cerrarse desde hace 10 días. Desde el 2 de enero toma sus gránulos a las 8 de la noche, en ayunas y después del medio día.

3 de enero. — Supuración habitual des-

de hace dos meses, es decir, compresa manchada en su parte media.

4 de enero. — Estado igual, apósito y venda manchados.

5 de enero. — Igual.

6 de enero. — Ligero cambio, compresa manchada de sangre viva.

7 de enero. — Más o menos semejante.

8 de enero. — Viaje a Marsella, no se hizo curación.

9 de enero. — Sorpresa, al quitar la gasa se nota una saliente que parte de la fístula, es dura y del tamaño de una moneda de 50 céntimos, dentada, pulida desigualmente. Se diría que es una lámina ósea blanca, limpia, terminada por una pequeña nervadura. Es sin duda una esquirra que sale por primera vez. La conservo en alcohol.

10 de enero. — Nueva sorpresa, se presentaron las reglas, sin conmoción, sin mal-estar. Poca supuración.

11 de enero. — Continuación de las reglas, supuración muy disminuída, más sangre, desde la expulsión de la esquirra y la aparición de las reglas.

12 de enero. — Muy poco pus, se diría que la fístula se llena y se estrecha. Las reglas se suspenden.

13 de enero. — Apósito casi seco, el pie se deshinchaba más cada día. Vuelta de la regla.

14 de enero. — Jacoba entra en sus 14 años. El pie está cada vez más normal, supuración imperceptible.

15 de enero. — La fístula se estrecha más, un punto que siempre supuraba se ha cerrado y cicatrizado completamente. Se terminaron las reglas.

16 de enero. — En el apósito pus seco.

17 de enero. — El mismo estado. Ha

tenido tres hemorragias de la nariz en este verano y una en nochebuena; yo pensé que la sangre buscaba salida y quizás esto tenga mucha influencia en su caso, según pienso.

18 de enero. — Absolutamente nada en la compresa, la gasa está tan limpia como si se acabase de sacar de la caja. Ninguna secreción y la fístula cada vez más se cierra.

Hemos abreviado la carta de la cual tomamos los datos complementarios siguientes: Jacoba L. se enfermó el 6 de enero de 1932. Fué operada el 26 del mismo mes por un cirujano eminente que diagnosticó la existencia de un foco de osteomielitis en el calcáneo. Fué vuelta a operar en junio de 1933. La enferma nunca ha sufrido y desde que dejó las muletas camina sin la menor molestia. En junio de 1933, después de la segunda operación, el cirujano le dió Acetylarsan, en inyecciones. Como consecuencia la enfermita se desarrolló mejor. La fístula que tenía 8 centímetros se cerró en dos centímetros de manera que quedó de la longitud de 6 cm. por cuyo motivo otro cirujano, también eminente, aconsejó otra operación. *Syphilinum*, como dice la tía, "llegó a tiempo".

No habiendo visto a la enferma, es imposible diagnosticar retrospectivamente si se trató de osteomielitis o de sífilis. Dada la competencia del cirujano se debe admitir el diagnóstico de osteomielitis desarrollada en un terreno sífilítico. La magnífica apariencia de la enferma, que, aunque de edad de 13 años parecía tener 16, no es sorprendente. Existen casos de tuberculosis florida como existen casos de sífilis florida. El fracaso del tratamiento antisifilítico, sino completo, pues obró sobre la lesión, tampoco es sorprendente. Los pediatras saben que el tratamiento antisifilítico solo, es insuficiente en numerosos casos de sífilis hereditaria. La superioridad de *Syphilinum* es notable en estos casos. En fin, una palabra más sobre la aparición de las reglas a

consecuencia del tratamiento con *Syphilinum*. Hay muchos médicos que niegan la existencia de las reglas sustitutivas. ¿Se necesita de un caso más típico que el nuestro para demostrar la realidad de este hecho? La jovencita bien desarrollada no reglaba todavía cuando fué sometida al tratamiento antisifilítico. Se sabe que la sífilis ataca las glándulas endocrinas. Es muy probable que el tratamiento antisifilítico hecho en junio hubiese despertado la función ovárica, pero no lo suficiente para provocar la aparición de las reglas verdaderas. Así fué como se presentó la epistaxis en períodos irregulares de que habla la tía en su carta. Con *Syphilinum* esta función ovárica se normalizó.

Tradujo Dr. Rafael Romero.

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, 1939.

* * *

Estimado lector:

¿Le debéis a la Homeopatía la curación de una grave enfermedad aguda o crónica, después de haber ensayado otros métodos terapéuticos sin resultados benéficos para vuestro caso?

¿Le debéis a la Homeopatía la conservación de vuestra salud y la de vuestros familiares?

Si habéis confirmado la eficacia de la Ciencia de Hahnemann, tenéis pues el deber moral de contribuir a la noble cruzada en que la "Asociación Homeópata de Chile" se halla empeñada, es decir, a la propagación de la Doctrina Médica Hahnemanniana y a cooperar en la recolección de fondos para establecer un Policlínico y un Hospital dedicado exclusivamente a la práctica de la Terapéutica homeopática. ¡Es un bien que se hará a nuestro país!

CULTURA MEDICA GENERAL.**EL TRATAMIENTO DE LAS OTITIS MEDIAS CRONICAS
POR LA IONIZACION DE ZINC**

Por Emilio E. Tolosa, de Argentina

El objeto de este trabajo no es presentar una nueva medida terapéutica sino actualizar un eficaz procedimiento fisioterápico cuya poca difusión, o abandono quizás, entre los otólogos, se mantiene por causas o razones que escapan actualmente a nuestra crítica. Nosotros hemos tratado ya numerosos enfermos con este procedimiento y podemos manifestarnos completamente satisfechos de él. Veremos más adelante cuales son las indicaciones estrictas y cual es su técnica.

El procedimiento consiste en la aplicación de los efectos de la corriente galvánica en su pasaje a través de una solución de una sal de zinc. Usada la corriente galvánica con propósitos terapéuticos puede definírsela con Hollender como un flujo directo y constante de electricidad de bajo voltaje y bajo amperaje produciendo efectos bioquímicos y respuestas neuromusculares.

Esta corriente puede ser empleada para introducir o transferir medicamentos en la intimidad de los tejidos del cuerpo, recibiendo en tal caso el nombre de "ionización" o "cataforesis" (del griego Kata — cruzar, y phoresis — orientación, rumbo); son sinónimos asimismo del término "iontoforesis". Los "iones" (del griego ions — ir, yendo) de una preparación cualquiera penetran en los tejidos bajo la influencia de la corriente galvánica. El concepto más simple de un "ion" es el que lo interpreta como un átomo o un grupo de átomos que tienen, o una carga positiva (aniones) o bien una carga negativa (cationes). El equivalente griego de "yendo" es aplicado a es-

tos átomos cargados eléctricamente porque son atraídos hacia el polo opuesto y migran hacia él, es decir, los átomos positivos (aniones) van al polo negativo y los átomos negativos (cationes) van al polo positivo. Virtualmente el término ionización es sinónimo de iontoforesis (cataforesis), pues en su interpretación más estricta se refiere a la disociación de iones en una solución dada.

La ionización está basada sobre dos leyes fundamentales que Michael Faraday las formuló de la manera siguiente:

1) La cantidad liberada de cualquier substancia es proporcional a la cantidad de electricidad que ha atravesado la célula o tejido colocado entre los electrodos.

2) El pasaje de cantidades iguales de electricidad liberan cantidades de iones químicamente equivalentes.

El principio fundamental en que se basa la aplicación de la ionización de zinc en el tratamiento de la supuración crónica del oído medio es la aseveración de Leduc quien dice: el ión zinc es un antiséptico de primera categoría, y no hay herida o úlcera que no pueda ser desinfectada con él, a condición de que pueda ser alcanzada por los electrodos en toda su superficie. Una de sus peculiaridades es que provoca una reacción inflamatoria muy pequeña". Los electrodos, o sea la substancia que se pondrá en contacto con los tejidos puede ser la solución de una sal de zinc que llenará a la cavidad a tratar, un trozo de gasa empapado en la solución que cubrirá a los tejidos, o bien un hilo desnudo de zinc introducido dentro de los tejidos. De las dos

primeras maneras se tratarán a las superficies infectadas, mientras que con el hilo se propende a la destrucción de los tejidos.

Dice Friel que en la inflamación supurada crónica del oído medio los gérmenes que invadieron los tejidos durante el estado agudo han quedado reducidos a una simple supuración gracias a las propiedades antibacterianas del cuerpo, y que en el estado de cronicidad, la irritación es determinada por un "suero en descomposición", producto a su vez, de los gérmenes, leucocitos destruidos y saprófitos diversos, que están permanentemente en contacto con la superficie de los tejidos.

La eficacia de la ionización en el tratamiento de la supuración crónica del oído se debe a los hechos siguientes:

1. La corriente eléctrica hace penetrar los iones en el exudado o en los tejidos desde una solución débil de una sal de zinc que está en contacto con la superficie a ionizar, siendo aquí la corriente eléctrica la fuerza conductora y no el poder de dilución de la solución.

2. Una vez introducido el ión zinc, se combina con la albúmina del exudado, de los elementos tisulares vivos, de las células sanguíneas o de los microorganismos, formándose un compuesto de zinc y albúmina, que es insoluble y que tiene el aspecto de un precipitado o coágulo. Las células mueren debido a la modificación de sus condiciones biofísicas, siendo por lo tanto el ión zinc un antiséptico. El coágulo albuminoso se extiende, además, a manera de una cubierta protectora, sobre la superficie de los tejidos, lo que favorece su reposo y el proceso de curación.

3. Los tejidos subyacentes no son irritados porque el ión zinc, una vez que se ha combinado con la albúmina, no se difunde. En el proceso de ionización no hay aumento de la concentración iónica de los tejidos, hay solamente una sustitución de iones, mientras que en la difusión desde una so-

lución hipertónica, los iones positivos y negativos son introducidos sin la correspondiente remoción de los iones de los tejidos. La penetración por difusión desde una solución iso o hipotónica de zinc es muy lenta.

Friel hace notar que la falta de reacción en los tejidos profundos es un factor esencial en el éxito de este tratamiento de la supuración crónica, y que, para que la antiseptia local sea eficaz, la solución deberá estar en contacto con toda la zona séptica, quedando sin efecto en la porción que estuviere fuera del alcance de la solución.

INDICACIONES

Sólo son susceptibles del tratamiento por ionización los casos con perforación timpánica, sin grandes pólipos o granulaciones, es decir, el caso de infección limitada a la cavidad timpánica, de otitis crónica simple; y la perforación debe ser de un tamaño tal que permita la libre penetración en la caja del líquido a ionizar. Así dice Asherson, pueden verse éxitos sorprendentes en casos de supuración de años con una sola ionización, y en los que el tratamiento por las vulgares gotas antisépticas se mostró ineficaz.

La labor previa a la aplicación del procedimiento, debe estar dirigida a la elección del caso apropiado, es decir, determinar en cada caso particular las probabilidades de éxito del tratamiento por la ionización de zinc. Para ello aconseja Friel:

1. Determinar qué factores están manteniendo la supuración, siendo en casi todos los casos la sepsis el factor fundamental. En algunas oportunidades puede la supuración estar mantenida por pólipos.

2. Averiguar si la zona de sepsis es accesible en toda su extensión.

Estas cuestiones quedan dilucidadas con un examen prolijo y detallado del oído enfermo. Se observará la cantidad y la ca-

lidad de la supuración. Se verá si es mucosa o francamente purulenta; en este último caso si es cremosa y fétida, y se apreciará cuidadosamente si en las maniobras de limpieza la caja sangra con facilidad. A la otoscopia se recogerán todos los detalles posibles del tímpano y de la caja: tamaño y posición de la perforación, presencia de granulaciones o de pólipos. En casos de pequeña perforación, es de gran utilidad el empleo del spéculum de Siegle que dará una idea del sitio por donde aparece el pus, cuyo examen cualitativo ilustrará sobre la naturaleza de las lesiones que le dan origen.

Se completa luego este examen con el de la garganta y fosas nasales en la pesquisa de algún foco inflamatorio crónico a nivel de las tonsilas, y muy especialmente la rinofaringe donde podrá con relativa frecuencia encontrarse la presencia de tejido adenoideo en condiciones desfavorables para la curación del proceso supurante del oído. Con el mismo criterio se investigará si hay rinitis o procesos inflamatorios en los senos paranasales, o si existe alguna alteración arquitectural del septum que condicione insuficiencia respiratoria.

Sólo así, con el estudio clínico detenido del caso dado podrá determinarse si la ionización de zinc es un tratamiento apropiado para él. Cuando existen factores agregados para la persistencia de la supuración purulenta o mucopurulenta, ellos serán tratados en primer término de manera de reducir el caso a un estado de sepsis auricular pura. Con este propósito se tratarán correctamente todos los procesos capaces de producir reinfecciones por vía tubárica. Las amígdalas moderadamente hipertrofiadas pero no inflamadas no perjudican a la curación, no así las que están francamente inflamadas o las adenoides que obstruyen la nasofaringe, y que requerirán su extirpación. Cualquier supuración nasosinusal, caries dentarias con gingivitis y piorrea serán también,

por consiguiente, objeto de especial atención.

TECNICA

Para asegurar que la solución a ionizar esté en contacto con la superficie de los tejidos es necesario practicar una prolija limpieza preliminar, extirpándose cuidadosamente todos los restos de descamación, humedecidos por la supuración; hecho esto se irriga el oído con una solución débil de sulfato de zinc.

Puede utilizarse directamente una solución de sulfato de zinc al 0,50 gr. %, o mejor aún, como lo aconseja Friel la fórmula siguiente: sulfato de zinc 5 gr., glicerina 60 gr. y agua hasta completar 1000 gr., solución que se diluirá con agua caliente, a partes iguales, en el momento de utilizarse.

Con el paciente en decúbito lateral se le instila en el oído la solución y se coloca en el pabellón auricular un spéculum de material aislador que lleva en su interior una varilla de zinc la que se conectará con el terminal positivo de una batería galvánica. El electrodo indiferente se coloca en otra parte del cuerpo, de preferencia en el antebrazo. Dispuestas así las cosas, se hace pasar la corriente elevándola lentamente desde 0 hasta 3 miliamperes, y al cabo de 10 minutos se la reduce a 0, también lentamente. Se retira el electrodo auricular y se examina nuevamente al paciente pudiendo verse en la profundidad de su meato que un coágulo lechoso recubre la superficie de la lesión, el cual no debe ser extirpado. Si los tejidos han sufrido una tumefacción es conveniente mantener al oído lo más limpio y seco posible, insuflando para ello polvos de ácido bórico. Se prevendrá al paciente que no se haga nada en el oído y que regrese a la consulta al cabo de una semana; se encontrará entonces: 1) que el oído está enteramente seco y libre de su-

puración e inflamación; 2) que existe una pequeña supuración mucosa; o 3) que persiste aún una cantidad considerable de supuración.

La primera eventualidad significa que el tratamiento ha sido eficaz, pero se prevenirá al paciente que evite cuidadosamente la penetración de agua en su oído ya que esto podría determinar una recidiva del trastorno. En el caso de que exista mucus al cabo de una semana, se insuflará polvo de ácido bórico que secará probablemente al oído. En el tercer caso se limpia y se reexamina cuidadosamente al oído para determinar la razón de la persistencia de la supuración; el espéculum de Siegle se utiliza para ello con provecho. Pudo ocurrir que en la primera sesión terapéutica la succión haya determinado cierta congestión, lo que unido al edema inflamatorio de los tejidos impedirían a la supuración penetrar en la cavidad timpánica; después de la ionización, y debido a ella, la tumefacción inflamatoria de los tejidos es mucho menor y puede observarse el pus en el momento de la succión con mayor facilidad. El diagnóstico de los casos difíciles puede entonces, por medio de la ionización, ser más fácil.

A veces una pequeña granulación ligeramente sangrante llama la atención hacia la pared posterior del meatus donde se encuentran algunas células supurantes, las que se limpiarán prolijamente y se les llenará con la solución de zinc procediéndose a ionizarla con un dispositivo especial.

EFFECTOS DE LA IONIZACIÓN

En el tratamiento de una superficie supurada o de una cavidad cubierta por una membrana mucosa como lo es el oído medio la ionización de una solución cualquiera de zinc es más eficaz que el empleo de una solución cualquiera de dicha sal. La razón de ello es lo siguiente: Durante la ionización se ponen en movimiento dos

corrientes de iones, en direcciones opuestas, extendiéndose cada una de ellas de un electrodo al otro, y consistiendo en una cadena ininterrumpida de iones. Veamos en concreto lo que ocurre. Se arrolla al brazo o cualquier otra parte del cuerpo un trozo de paño o algodón empapado en solución salina y se le conecta al electrodo o polo negativo. El polo positivo está conectado por medio del dispositivo arriba descrito, a la superficie del oído medio. Cuando pasa la corriente eléctrica los iones positivos se dirigen hacia el polo negativo, es decir, que a partir de la solución colocada en el oído los iones positivos de zinc penetran en los tejidos y reemplazan a los iones de potasio y sodio, los que, positivos también, están moviéndose en dirección al brazo; tales iones positivos abandonan en el brazo a los tejidos y, reemplazan a los iones de sodio del paño empapado en solución salina que hace las funciones de electrodo negativo. Un desplazamiento semejante de iones tiene lugar en dirección inversa desde el paño al polo o electrodo positivo del oído. Lo esencial de este procedimiento es entonces la sustitución de los iones de los tejidos de la zona tratada por los iones desplazados desde la solución, es decir, para el caso presente que en el oído penetran únicamente los iones de zinc, y en este sentido la acción de la corriente eléctrica es única. No se conoce otro método por medio del cual puedan introducirse en los tejidos solamente los iones positivos de una sal, o los negativos.

Cuando los iones de zinc son forzados por la corriente eléctrica a penetrar en el exudado de la superficie o en los tejidos propiamente dicho se combina con la albúmina de dicho exudado o con las células vivas. Se forma así un compuesto blanco consistente que es un precipitado insoluble, difícil de suprimirsele, y que es un mal medio de cultivo para las bacterias. El ión zinc que se combina con la albúmina no

se difunde, y su acción queda limitada hasta la profundidad a que fué introducido y por consiguiente los tejidos subyacentes no son irritados.

Cuando se deja en contacto con los tejidos una solución de sal de zinc, sin hacer pasar corriente eléctrica la penetración que tenga lugar es debida únicamente al fenómeno de difusión, que para el caso de las soluciones hipotónicas es extremadamente lenta, pero que lo es rápida con las soluciones hipertónicas, introduciéndose simultáneamente por este mecanismo, tanto los iones positivos como los negativos. Esto determina un gran aumento de la concentración iónica de los tejidos determinándose una enérgica reacción de éstos y la consiguiente eliminación de células y tejidos. Se comprende por lo tanto que el uso de soluciones fuertes de sales de zinc con fines antisépticos no sea conveniente para el oído medio.

Cuando el sepsis es el único factor responsable de persistencia de la supuración y su zona es accesible en su totalidad, el uso de la solución débil de zinc y de la corriente eléctrica asegura el reposo de la zona irritada, produciéndose la curación y la desaparición rápida de la supuración.

En algunas oportunidades la aplicabilidad de este procedimiento está dificultada por algunos factores como la presencia de granulaciones o de pólipos, o de perforaciones timpanales de tamaño reducido, los que impiden la penetración de la solución que debe cubrir toda la superficie enferma. Para suprimir estos inconvenientes puede utilizarse asimismo la acción coagulante del zinc destruyendo unos (granulaciones, pólipos), o ampliando la brecha timpanal. El método conveniente para ello es el de introducir una varilla de zinc dentro de los tejidos a destruir y conectarla con el positivo de una bacteria. El electrodo negativo puede ser otra varilla colocada cerca, pero no en contacto con la primera.

Con el mismo procedimiento puede ampliarse una pequeña perforación del tímpano de manera que permita el acceso a la zona séptica. Ello se hará especialmente en los casos de infección del ático donde los restos de las membranas están tan cerca del promontorio que sólo deja una pequeña hendidura. Las puntas de las varillas de zinc deben ser mantenidas en este caso firmemente contra la porción de membrana que se desea destruir. Una perforación en la membrana de Sharpnell puede también ampliársela si se considera necesario.

Si se comprueba que el pus viene del antro con las características de la supuración colesteotomatosa, o si las ionizaciones repetidas, que no deben practicarse a cortos intervalos, se han mostrado ineficaces, debe recurrirse al tratamiento quirúrgico apropiado al caso.

Podemos decir, apoyando lo que nos enseñan Friel y Asherson que en la mayoría de los casos una sola ionización es suficiente para dilucidar el diagnóstico, y conducirnos a emprender otro procedimiento terapéutico cuando la zona de sepsis es de difícil acceso.

De "Anales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata", Argentina, 1942.

CONTRA ALMORRANAS

use los medicamentos homeopáticos en combinación con la Pomada de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago

Santo Domingo 1022

HÁGASE SOCIO DE LA
Asociación Homeópata de Chile
 SANTIAGO — CASILLA 970

Divulgaciones Científicas.

LA PENICILINA

DIFICULTADES EN SU PREPARACION Y SU EXPERIMENTACION
PARA CONSIDERARLA COMO MEDICAMENTO HOMEOPATICO

Trabajo presentado por el Dr. Amaro Azevedo, Secretario Internacional del Congreso Médico Homeopático Panamericano y representante de la misma entidad al Congreso Sudamericano de Homeopatía, realizado bajo los auspicios de la Liga Homeopática de Río Grande del Sur, Brasil

La Penicilina está en estudio; el mundo médico está interesado en ella, haciéndose importante su investigación para los estudios contemporáneos. La divulgación de los milagros operados por la Penicilina no dejan de interesar a los homeópatas del mundo entero, y así como los más destacados médicos homeópatas mexicanos, brasileños, norteamericanos y de otros países se preocuparon con el estudio de las sulfamidas, de las vitaminas y de las hormonas dentro del terreno homeopático, hoy también buscan la posibilidad de empleo de la Penicilina a fin de que ésta se torne en uno de los medicamentos homeopáticos.

Para ello se nos presentan dos problemas importantes:

PRIMERO, *la preparación del medicamento y su dinamización.*

SEGUNDO, *su experimentación en el hombre sano.*

LA PREPARACION DE LA PENICILINA, SUS INDICACIONES Y EXPERIMENTACION

Los médicos homeópatas que manejan las materias médicas conocen la patogenesia de medicamentos originados por hongos diversos, de comprobada eficacia en Homeopatía. Hace más de 150 años que Hahnemann estudió y experimentó en el hombre sano, con resultados maravillosos, por ejemplo: *Agaricus muscarius*; otros hongos co-

mo *Boletus laricis*, *Ustilago maydis*, *Solanum tuberosum aegrotans*, *Claviceps purpurea* y muchos otros fueron igualmente estudiados y empleados con óptimos resultados.

El caso del *Penicillium notatum* en cambio, cuya preparación exige una técnica enteramente especial, dada su alta sensibilidad, no encuadra en los moldes comunes. Su transformación en el adecuado producto activo y su ultrasensible y delicada preparación es asunto que debe preocupar en forma especial a los farmacéuticos homeópatas, no sólo del Brasil sino del mundo entero.

Tanto en la preparación de los medicamentos como en su forma de experimentación e introducción al organismo, los métodos son diferentes en las doctrinas homeopáticas y alopáticas, no existiendo términos medios. **Debemos, por tanto, esperar el resultado de la experimentación pura que será por cierto la que nos señalará las indicaciones precisas.**

Digo que los métodos alopáticos son diferentes porque en tanto que hay la preocupación de los alópatas en establecer que 1,20 gr. de Penicilina son necesarios para la cura de una simple hemorragia, por un costo mínimo de Crs. 1,200,00, o sean 60 dólares americanos, tal vez descubierto el proceso de estabilización y conservación de los poderes curativos de la Penicilina en Homeopatía, este 1,20 gr. sería capaz de

curar quizás 1000 personas y su costo sería reducido a la cifra de Crs. 1,20 céntavos.

Esta es la razón de por qué es forzoso que la preparación de la Penicilina sea dotada de una técnica especializada huyendo de las normas vulgares establecidas por nuestras farmacopeas. Cuando consigamos la preparación de nuestra *Penicilina* y la experimentemos, estaremos en condiciones de ofrecer una vez más a la humanidad magníficos beneficios, por ser la medicina homeopática el arte de curar a los pobres, demostrando que no solamente con dinero es como se puede tratar a las enfermedades que requieren el empleo de medicamentos carísimos, no accesibles a los bolsillos modestos, quedando así destruído el aforismo de que la medicina es el arte de curar a los ricos.

Las máximas dificultades técnicas en la preparación de la Penicilina podrán ser disminuídas, aunque jamás eliminadas, pues las oxidaciones, la facilidad de contaminación de los medios de cultivo, el bajo rendimiento en productos útiles elaborados por el *Penicillium notatum* son verdaderos obstáculos que se anteponen a los mejores preparados.

Por otra parte, la extrema sensibilidad de la Penicilina al calor, a los agentes oxidantes y a los más vulgares cationes difícilmente serán removidos para la preparación de la Penicilina en escala industrial, gastando en media cada doliente que se trate por los medios alopatícos 1,20 gr. En cambio, como ya dije, nosotros los homeópatas discutiremos el asunto, nos comprometemos a empeñar nuestros esfuerzos y verificar la manera de, por precio reducido y con los medios adoptados por la Homeopatía, llevar incalculable beneficio a la humanidad haciendo la preparación de la Penicilina atenuada y dinamizada, y experimentada en el hombre sano conforme a nuestros métodos, adoptados con ventajas inapreciables.

Quizás también se nos alegrará la posibilidad de efectuar la síntesis de la Penicilina. La química orgánica que hizo el milagro de producir sintéticamente la gramicidina, la tiroidina, los polipéptidos de moléculas complejas, podrá llegar al resultado final de la preparación sintética de la Penicilina cuya fórmula bruta ya es conocida, haciéndose así su costo mucho menos caro.

Sin el experimento en el hombre sano, jamás será la Penicilina un medicamento homeopático, aun cuando no sea desconocido por nosotros que las experimentaciones clínicas (que distan mucho de las experimentaciones homeopáticas) se intensificaron en el Hospital Gral. Bushnell en Brig-

HAMAMELIS

es lo que distingue los productos

HAMETA
M. R.

de todos los otros artículos de tocador

Crema día y noche

Leche

Agua para la cara

Loción para el pelo

Champú

Vinagre de tocador

**H
A
M
E
T
A**

Hamamelis es un extracto vegetal importado de EE. UU., que ayuda a aumentar la formación de los tejidos cutáneos, muy usado en la Homeopatía.

Al comprar un producto HAMETA le regalaremos un Champú HAMETA contra entrega de este aviso.

Pida un folleto explicativo en

Central de Homeopatía
Santo Domingo 1022

Farmacia El Indio
Ahumada 2

Farmacia Santo Domingo
21 de Mayo 586

han City siendo empleado con ventaja y éxito en los soldados que regresaban del Pacífico con fracturas expuestas no cicatrizadas, osteomielitis y heridas con infecciones crónicas.

Según el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (año XXII, N.º 10 - 943) los resultados obtenidos con la Penicilina en cerca de 600 personas en casos de osteomielitis crónicas y agudas, celulitis, ántrax de la cara y del labio, neumonía (está visto el caso del Premier Churchill), empiema, heridas infectadas, quemaduras, atestiguan excelentes resultados. En las blenorragias que resistieron los tratamientos efectuados con la Sulfanilamida, la Penicilina demostró su eficacia en dosis de 500.000 a 1.000.000 de Unidades Oxford, siendo el tratamiento continuado por 10 a 16 días. ¡Tales resultados son prodigiosos!

Motivado por los resultados obtenidos por la Penicilina, experimentadores como Wiesner usaron la substancia producida por el *Aspergillus clavatus*, Wakman por el *A. fumigatus* experimentando en las infecciones bacterianas (Jour. Am. Med. Ass., 1252 de 29 de agosto de 1942). Conviene recordar que la Penicilina fué descubierta por A. Fleming (Brit. Ex. Pth., 10,226, en 1929) cuando fueron hechos los primeros estudios, siendo efectuados las primeras observaciones por Florey en 1940 - 41. La Fundación Rockfeller en 1941, gracias al apoyo dado por el Consejo Nacional de Investigación del Ministerio de Agricultura, juntamente con Florey, intensificaron el estudio de la Penicilina. En América del Norte las pruebas clínicas preliminares son originales de Dawson, en 1941.

Por tales experiencias verificaron los doctos investigadores que la eliminación

urinaria de la Penicilina es rápidamente seguida a su aplicación por vía endovenosa o muscular. El correcto empleo de nuestros medicamentos es por vía oral y en la experimentación que hagamos deberemos tener en consideración la vía de introducción al organismo del nuevo medicamento (*).

Los alópatas usan la Penicilina por vía endovenosa o muscular en una dosificación inicial de 120.000 unidades diarias durante 2 o 3 días y un total de 500.000 unidades en los casos más graves, sin embargo ha sido observado no ser de efectos apreciables la aplicación por vía oral.

Para nosotros los homeópatas la cuestión de dosis es muy importante, los alópatas desconocen el valor de las infinitesimales, tanto es así que la Of. Sanitaria de la Ciudad Bringham llamó la atención de los médicos para que no usaran la droga en exceso, debiendo restringir al mínimo la dosis terapéutica alopática.

Para nosotros, la dosificación infinitesimal, una vez conseguida y después de vencer las dificultades mencionadas sería de real ventaja y de costo baratísimo, pudiendo cada soldado de nuestro ejército ser portador de una dosis de Penicilina que al Gobierno costaría el mínimo precio con resultados óptimos, utilizándola en las ocasiones adecuadas, por vía oral, una vez experimentada convenientemente en el hombre sano. Aprovechemos la oportunidad proponiendo al Congreso Médico Homeopático que estudie este asunto poniendo en conocimiento del gobierno del Gral. Mas-

(*) Aunque no es ajena a la técnica homeopática el uso hipodérmico de substancias dinamizadas, como en el caso de apoplejía, del *Aconitum*, *Arnica*, *Belladonna*, *Opium*, etc.—A. S. V.

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»

carenhas de Moraes, Comandante de las fuerzas expedicionarias, nuestro propósito, en el sentido de ser llevada adelante por medio del Congreso y de la Liga Homeopática de Río Grande do Sul el estudio en este sentido y aprestándose a dar a conocer experimentos y datos clínicos tan pronto como sean realizados con buen éxito, ya que es reconocida la eficacia de la Penicilina en el tratamiento de las infecciones estafilocócicas, gonocócicas, neumocócicas, estreptocócicas, hemolíticas y no ofreciendo ventajas terapéuticas su empleo en las endocarditis bacterianas.

Los resultados negativos observados con el uso de la Penicilina en la tuberculosis, en la tripanosomiasis, en la sífilis, podrán tal vez ser satisfactorios con la Penicilina empleadas en dosis mínimas de naturaleza infinitesimal, aconteciendo lo mismo con el tratamiento de las infecciones bacterianas que también resisten a la Penicilina.

PRODUCCION DE LA PENICILINA EN EL BRASIL

Estamos informados de que en Porto Alegre el Instituto de Higiene está preparando con regularidad Penicilina, habiendo obtenido ahora un total de 100.000 unidades. En Río de Janeiro, en Bahía y en Sao Paulo la producción está dando cifras muy considerables.

PENICILINA E INFRARROJOS

Los investigadores norteamericanos probaron que los rayos infrarrojos aumentan la producción de Penicilina haciéndola secar con mayor rapidéz.

Es, pues, una buena forma que debe ser introducida al Brasil para intensificar la producción en gran escala, de este excelente medicamento.

VITAMINA D, PENICILINA Y CORRIENTE ELECTRICA

Es conocido por los investigadores americanos el hecho experimental del Dr. Walter Bauer de Boston, quien aplicó la vitamina D en 18 casos de artritis crónica sin resultados satisfactorios, consiguiendo, en cambio del alivio de algunos dolientes con el empleo de la citada vitamina, el dato de que las grandes dosis eran siempre peligrosas.

Juzgaba el Dr. Walter que en ciertos preparados de vitamina D, había subproductos tóxicos (los cuales existen también en la Penicilina), cuando surgió el Ing. Charles Comfort haciendo estudios sobre la vitamina D y su acción sobre el organismo humano y en relación con el raquitismo.

El Dr. Comfort despreciando la rutina de aplicar a la vitamina D, la luz ultravioleta, hizo pasar a través de vapores de ergosterol una poderosa corriente eléctrica, obteniendo el conocido producto Ertron que, estando libre de subproductos tóxicos, exime a la vitamina D del peligro de su aplicación, curando al mismo tiempo no sólo los casos de artritis sino los de raquitismo. Y bien, lo que se hizo con la vitamina D, ¿no podría ser hecho con la Penicilina?

Así doy por cumplida mi humilde labor de colaboración presentando este pequeño trabajo para animar de un poco de buena voluntad a la docta concurrencia que se congrega aquí en torno del esfuerzo inaudito de nuestro amigo y colega David Castro.

No es, por tanto, este trabajo de naturaleza científica, pues el tiempo que me fué concedido para confeccionarlo fué exiguo, en cambio, al prepararlo, lo hice en señal de alerta para el estudio de la Penicilina en Homeopatía, apuntando sus ventajas, las dificultades que tenemos que ven-

cer para su preparación y su experimentación a fin de convertirla en medicamento homeopático, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los efectos de las observaciones clínicas publicadas, una vez verificados las intoxicaciones y trastornos, su empleo, de cierto modo dará indicaciones precisas, cuando por la ley de los semejantes individualicemos: Penicilina.

De lo contrario, incurriremos en el yerro de marchar con la moda terapéutica de cada época, hecho que no ha acontecido con los medicamentos experimentados y usados por la Homeopatía desde su creación.

Dé "Medicina Homeopática Mexicana", 1944.

¡Esté Usted atento a Radio "El Mercurio" para escuchar el minuto sobre Homeopatía!

NOTICIARIO

CHARLA SOBRE HOMEOPATIA. — El 21 de noviembre, a las 19.15 horas en los Salones de la Unión Comercial, el Secretario de la Asociación Homeópata de Chile, Sr. Alfredo Serey Vial, dió una charla, cuyo tema "La Homeopatía progresa en todo el mundo" mereció comentarios elogiosos de los médicos homeopatas y de la selecta concurrencia. A pedido de los asistentes, este trabajo será publicado en el próximo número de esta revista.

La próxima conferencia se efectuará en el Salón de Honor de la Universidad Católica, y estará a cargo del Dr. Gómez Ugarte. La fecha ha sido fijada para el día 14 de diciembre, a las 19 horas.

PENSIONADO HOMEOPATICO. — Constituyó un éxito social la fiesta de inauguración de la Clínica Homeopática del Dr. Pineda, efectuada el 8 de noviembre, con la asistencia del Excmo. y Revdo. Sr. Arzobispo y personalidades médicas y sociales.

REVISTA MEDICINA HOMEOPATICA

TARIFA DE AVISOS:

Tapas (a excepción de la portada):	Por cada publicación
1 página.....	\$ 600,—
1/2 página.....	\$ 360,—
Interiores:	
1 página.....	\$ 400,—
1/2 página.....	\$ 230,—
1/4 página.....	\$ 145,—
1/8 página.....	\$ 95,—

Contratos anuales, tarifa especial.

APARECIÓ!...

LA 3.^a EDICION DE

GUIA HOMEOPATICA

CORREGIDA Y AUMENTADA

con indicación de las enfermedades corrientes con su tratamiento homeopático y la característica de 250 medicamentos.

Precio \$ 35,— (contra reembolso \$ 38,—)

Pedidos a

Central de Homeopatía Hahnemann

SANTIAGO

SANTO DOMINGO 1022 - TELEF. 88290 - CASILLA 325

PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPEUTICA HOMEOPATICA

A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda estudiarla por libros según el plan siguiente:

- 1) Charette, Qué es la Homeopatía
- 2) Bercher, La Homeopatía sin misterio
- 3) Tétau, Los policrestos homeopáticos
- 4) Duprat, Teoría y técnica homeopáticas
- 5) Nash, Indicaciones características
- 6) Clarke, Formulario homeopático (agotado)
- 7) Chiron, Materia Médica

Cursos Universitarios (se exige título de médico):

Hahnemann College, Philadelphia USA
Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.
Escuela Homeopática de Mérida (Yuc.) México
Facultad de Medicina Homeopática, México

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATIA

La Homeopatía fué creada por el sabio médico alemán Samuel Hahnemann (1755 - 1843) quien publicó los fundamentos de su sistema en el "Organon" (1810).

1.º La ley de los semejantes: La curación de una enfermedad se efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos producen fenómenos semejantes a la enfermedad que se quiere curar.

2.º La experimentación pura: Para determinar el cuadro de síntomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se han completado con los síntomas clínicos.

3.º Las dosis pequeñas: Siendo el cuerpo enfermo mucho más sensible que el cuerpo sano, para obtener una reacción se necesitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plantas frescas. Es de suma importancia adquirirlos en un establecimiento acreditado y especializado en Homeopatía, como por ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATIA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATIA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,
marca registrada para nuestra casa.